

Polikliininen gastrokirurginen toimenpide

Polikliinisella toimenpiteellä voidaan hoitaa erilaisia gastrokirurgisia ongelmia, kuten peräpukamia tai peräaukon pientoimenpiteitä. Toimenpide tehdään tarvittaessa humausavusteisesti paikallispuudutuksessa.

Ennen toimenpidettä

Jos käytössäsi on jokin verenohennuslääke (Marevan, Eliquis, Xarelto, Plavix, Clopidogrel) ota yhteyttä hyvissä ajoin karttaliitteessä olevaan puhelinnumeroon.

- Käy suihkussa ennen sairaalaan tuloa.
- Pukeudu väljiin ja mukaviin vaatteisiin, jotka on helppo pukea ja riisua. Jätä arvotavarat, korut ja suuret rahasummat kotiin.

Toimenpidepäivänä

- Ole syömättä ja juomatta vähintään 6 tuntia ennen toimenpidettä.
- Voit ottaa säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet toimenpidepäivän aamuna, jos niistä ei ole sinulle erikseen annettu muuta ohjetta. Ota tuntia ennen sairaalaan saapumista parasetamolia 1g suun kautta. Lääkitys lievittää kipua ja helpottaa toimenpiteen suorittamista.

Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen jälkeen olet sairaalassa muutaman tunnin tarkkailtavana ja saat pienen välipalan.
- Kotiutus tapahtuu samana päivänä.
- Toimenpidepäivänä et saa itse ajaa autoa. Tämän vuoksi sinulla tulee olla toimenpiteen jälkeen hakija, joka saattaa sinut kotiin. Lisäksi seuranasit tulee olla aikuinen yön yli.
- Toimenpiteen jälkeen pääset kotiin seurannan jälkeen, kun voitisi tuntua hyvältä ja olet saanut kotihoito-ohjeet.
- Tarvittavat kotiutuspaperit saat ennen kotiutusta (sairausloma, kipulääkereseptit, haavanhoito-ohje).