

## Ohje vanhemmille propranolol lääkityksestä

Lapsellenne ollaan aloittamassa hemangiooman hoidoksi propranolol -lääkitys.

### Lääkkeen aloitus

Lääke aloitetaan poliklinisesti tai osastolla iästä riippuen. Ennen lääkkeen aloitusta lääkäri tutkii lapsenne. Osastolla aloitettava hoito kestää 1-2 vuorokautta. Sinä aikana seurataan verenpainetta ja verensokeria, koska lääke saattaa laskea niitä.

### Lääkitys ja ruokailu

Verensokerin liiallista laskua voidaan estää säännöllisillä ruoka-ajoilla. Syöttövälit eivät saa venyä liian pitkiksi. Lääke annetaan juuri ennen ruokailua. Ruokailuvälit eivät saa venyä liian pitkiksi.

- alle 6 viikon ikäsellä ruokintaväli enimmillään 4 tuntia
- 6 viikon – 4 kuukauden ikäisellä ruokintaväli enimmillään 5 tuntia
- yli 4 kuukauden ikäsellä ruokintaväli enimmillään 6-8 tuntia

Jos lapsen ruokahalu muuttuu merkittävästi huonommaksi esimerkiksi oksentelun, ripuloinnin tai korkean kuumeen yhteydessä, ottakaa yhteyttä lasta hoitavaan yksikköön.

### Lääkkeen annostelu

Lääke annetaan lapselle päiväaikaan. Lääkkeen antoajat suunnitellaan niin, että annosten väli on vähintään 6 tuntia ja päivän viimeinen lääke annetaan illalla kello 19. Näin vähennetään pidempään yösyöttöväliin mahdollisesti liittyvä matalan verensokerin riski.

Lapsen aloittaessa päivähoidon, lääkkeen annostelu voidaan käytännön syistä vaihtaa kahteen vuorokausiannokseen. Jos hemangiooma alkaa yllättäen kasvaa, olkaa yhteydessä lastanne hoitavaan yksikköön.

### Seuranta lääkityksen ajan ja lääkkeen lopetus

Kontrollikäynti ohjelmoidaan 4-6 viikon kuluttua lääkkeen aloituksesta, sen jälkeen 3-4 kuukauden välein. Hoito lopetetaan tavallisesti 12-14 kuukauden iässä, mutta se voi jatkua pidempäänkin. Lääkitys lopetetaan 2-4 viikon aikana laskemalla lääkeannoksia vähitellen.