

## **Rintarauhasen muutoksen poisto ultraääniohjauksessa**

### **Potilasohje**

Tutkimuksella selvitetään rintarauhasesta löydetyn muutoksen laatua.

### **Miten valmistaudut tutkimukseen?**

Ota mukaan napakat koko rinnan peittävät rintaliivit. 2-3 päivää ennen näytteenottoa mahdollinen verenohennuslääke jätetään tauolle, mikäli se perussairaus (esim. läppäproteesi) huomioiden on mahdollista. Näissä tapauksissa asiasta on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Myös käytössä olevat omega-3-valmisteet jätetään tauolle. Tutkimukseen ei ole muita esivalmisteluja.

### **Miten tutkimus tehdään?**

Näytteenottokohta puudutetaan aina ennen biopsiaa. Pistokohtaan tehdään pieni ihohaava.

Muutos poistetaan ultraääniohjatuksi.

Tutkimukseen tulee varata aikaa noin 1,5 tuntia.

### **Mitä tutkimuksen jälkeen?**

Näytteenoton jälkeen pistokohtaa painetaan kylmäpussilla vähintään 10 minuuttia verenvuodon välttämiseksi. Tutkimuksen jälkeen rintarauhanen saattaa tuntua aralta ja siihen kehittyä mustelma.

Pistokohta tulee pitää kuivana yhden vuorokauden ajan. Rasittavaa liikuntaa tulee välttää kahden vuorokauden ajan. Näytevastauksen valmistuminen kestää noin yhden viikon.

Tuloksista kuulet lähettävältä lääkäriltä.