

Rintarauhasen stereotaktinen imubiopsia

Potilasohje

Tutkimuksella selvitetään rintarauhasesta löydetyt muutokset laatuun.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

2-3 päivää ennen näytteenottoa mahdollinen verenohennuslääke jätetään tauolle, mikäli se perussairaus (esim. läppäproteesi) huomioon otettuna on mahdollista. Näissä tapauksissa asiasta on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Myös käytössä olevat omega-3-valmisteet jätetään tauolle. Tutkimukseen ei ole muita esivalmisteluja.

Miten tutkimus tehdään?

Näytteenottokohta puudutetaan aina ennen biopsiaa. Pistokohtaan tehdään pieni ihoaava.

Näytteet otetaan mammografialaitteella rintarauhasen ollessa napakassa puristuksessa.

Tutkimukseen tulee varata aikaa noin 1,5 tuntia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Näytteenoton jälkeen pistokohtaa painetaan kylmäpussilla vähintään 10 minuuttia verenvuodon välttämiseksi. Tutkimuksen jälkeen rintarauhanen saattaa tuntua aralta ja siihen kehittyä mustelma.

Pistokohta tulee pitää kuivana 1 vuorokauden ajan. Näytevastauksen valmistuminen kestää noin 1 viikon. Tuloksista kuulet lähettävältä lääkäriltä.