

Ruokatorven lämpökäsittely tähystyksessä eli RFA

Ennen tutkimusta

- Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta klo 24 lähtien.
- Vertaohentavan lääkkeen tauotus.
- Ennen tutkimusta sinulle laitetaan käsivarteen kanyyli.

Tutkimuksessa

- Tutkimuksen aikana olet kylkiasennossa tutkimus sängyllä.
- Saat kanyylin kautta rauhoittavaa ja kipulääkettä.
- Nieluusi suihkutetaan puudutusainetta.
- Tutkimus kestää alle 30 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

- Lääkityksen vuoksi voit olla tutkimuksen jälkeen unelias tai tuntea nielun yhä puutuneeksi tai kipeäksi.
- Saat syödä ja juoda 2 tuntia tutkimuksen jälkeen, mikäli voitisi niin sallii.
- Syö viikon ajan nestemäistä tai pehmeää ruokaa (mm. keitot, juomat, kiisselit, soseet, viilit jne.)
- Vointiasi seurataan toimenpiteen jälkeen valvonnassa.

Kotiutuminen ja jälkitarkastus

- Saat lähteä kotiin saattajan kanssa, yleensä kahden tunnin seurannan jälkeen.
- Mahdollinen jälkitarkastusaika tai uusi toimenpideaika lähetetään kotiin postitse.

Happosalpaaja (mm. Somac®, Nexium®, Zolt®)

- Käytä 2 viikon ajan happosalpaajalääkitystä tupla-annoksella.
- Sen jälkeen jatka normaaliannoksella.

Ongelmatilanteissa

- Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen.