

Rytmivalvurin asennus tai poisto

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Yleistä toimenpiteestä

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Rytmivalvuri asennetaan ihon alle vasemmalle I-IV kylkiluun seutuun lähelle rintalastaa. Toimenpide ja ohjaus kestävät 1–2 tuntia.

Ennen toimenpidettä

- Ole syömättä ja juomatta kaksi tuntia ennen toimenpidettä.
- Ota lääkkeesi normaalisti.

Toimenpiteen jälkeen

- Rytmivalvuri ohjelmoidaan ja saat laitteen käyttöohjeet.

Haavan hoito

- Voit poistaa haavasidoksen, kun toimenpiteestä on kulunut vuorokausi (24 tuntia). Tarvittaessa peitä haava apteekista ostetulla puhtaalla taitoksella.
- Kolmannelta päivästä lähtien voit kevyesti suihkuttaa haavaa. Kuivaa haava puhtaalla pyyhkeellä kevyesti painellen. Saunominen ja uiminen on kielletty kahden viikon ajan.
- Haava yleensä paranee hyvin, kun se pidetään puhtaana ja kuivana ja se saa ilmaa.

Vältä kiristävien ja hankaavien vaatteiden käyttöä, kunnes haava on kunnolla parantunut.

Ompeleiden poisto: _____ / _____ **20**_____.

Varaa itse aika terveydenhoitajalta esimerkiksi omasta terveyskeskuksestasi.

Ota yhteyttä jos

- Haavassa on yltyvää kipua.
- Haavasta vuotaa jatkuvasti verta tai muuta eritettä.
- Sinulle nousee kuume yli 38 asteen.
- Haavalla on lisääntyvää kuumotusta, turvotusta tai punoitusta.

Sydänsairaudet.fi tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.