

## Särkylääkeyliherkkyys

Osa astmaa sairastavista on yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle ja samalla vaikutusmekanismilla vaikuttaville tulehduskipulääkkeille (ns. NSAID-lääkkeille). Reaktioita, esimerkiksi astmakohtauksia, nokkosihottumaa tai sokkia, voi ilmetä odottamatta.

Esimerkkejä astmakohtauksia aiheuttavista särkylääkkeistä ja yliherkän astmapotilaan kipulääkityksestä:

### Sopimattomia särkylääkkeitä

- asetyylisalisyylihappo
- indometasiini
- fenyylibutatsoni
- naprokseeni
- tolfenaamihappo
- ibuprofeeni
- ketoprofeeni
- fenoprofeeni
- mefenaamihappo
- diklofenaakki
- piroksikaami
- meloksikaami
- tenoksikaami
- diflunisaali
- metamitsolinatrium (yksin tai yhdessä pitofenonihydrokloridin kanssa)
- tiaprofeenihappo
- aseklófenaakki
- etodolaakki
- ketorolaakki
- koksibit

### **Yleensä sopivia kipulääkkeitä**

- parasetamoli
- dekstropropoksifeeni (ei astmaoireiden ollessa vaikeita)
- petidiini (ei astmaoireiden ollessa vaikeita)
- oksikodoni
- buprenorfiini
- tramadolihydrokloridi
- spasmolyytit ja antikoliergit (esim. atropiinijohdokset ilman analgeetti- lisää)
- eräät migreenilääkkeet (esim. ergotamiini-antihistamiiniyhdistelmät ja 5HT1reseptoriagonistit)
- keskushermostoon vaikuttavat lihasrelaksantit (ilman analgeettilisää)

Luettelossa on mainittu vain lääkkeen vaikuttavan aineen nimi. Ilmoita aina särkylääkeherkkyydestäsi, kun lääkäri kirjoittaa sinulle kipulääkitystä.