

Sappihappojen imeytymishäiriöön Questran®-lääkitys

Questran® -lääkettä käytetään sappihappojen imeytymishäiriöstä johtuvan ripulin hoitoon. Aterian jälkeen ohutsuoleen purkautuu sappea sappirakon supistuksessa. Normaalisti sappihapot imeytyvät tehokkaasti takaisin verenkiertoon ohutsuolen loppuosasta noin 50–100 cm:n matkalla. Ohutsuolen loppuosan poisto saattaa aiheuttaa sappihappojen imeytymishäiriön, jolloin sappihappoja pääsee paksusuoleen. Tämä voi aiheuttaa ripulia. Lääke sitoo suolen sisällä itseensä sappihappoja estäen näin sappihappojen paksusuolen ärsytyksen. Lääkkeen teho on parhaimmillaan aamulla, jolloin sappirakko on täynnä sappea paastotun yön jälkeen.

Hoidon aloitus

- Lääkkeen annosta lisätään asteittain, jotta vältetään mahdollisilta haittavaikutuksilta.
- Ohje Questran® (4g annospussi) annostuksen nostoon

	ennen aamupalaa	aamupalan jälkeen	ennen lounasta	ennen päivällistä
1.päivä	1/2	-	-	-
2.päivä	1/2	-	1/2	-
3.päivä	1/2 - 1	-	1/2 - 1	-
4.päivä	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1	-
5.päivä	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1

Pitkäaikaishoito

- Pitkäaikaishoidossa saattaa esiintyä rasvaliukoisten A-, D- ja K-vitamiinien imeytymishäiriöitä, jonka vuoksi veren D-vitamiinipitoisuuden seuranta on tarpeen.
- Pyri pienimpään mahdolliseen tehokkaaseen annokseen haittavaikutusten välttämiseksi (enintään 4 annospussia päivässä).

Muut lääkkeet Questran® -lääkkeen kanssa

- Questran® -lääke voi haitata muiden lääkkeiden imeytymistä, kuten mm. Marevan®, Digoxin® ja Thyroxin®.
- Ota muut lääkkeet esimerkiksi:
 - vähintään tuntia ennen Questran® -lääkettä tai 4-6 tuntia Questran® -lääkkeen jälkeen.
 - Keskustele muiden lääkkeiden ottamisajankohdasta hoitavan lääkärin kanssa.