

## Silmän sädekehän laserhoito eli syklofotokoagulaatio

Sinulle on varattu aika syklofotokoagulaatiota (sädekehän laserhoitoa) varten. Toimenpide tehdään silmänpaineen alentamiseksi. Toimenpiteessä annetaan laservaloa silmän sädekehän alueelle, jossa silmänsisäistä nestettä syntyy. Tavoitteena on vähentää silmänsisäisen nesteen tuotantoa ja sitä kautta laskea silmänpainetta.

### Valmistautuminen

- Voit syödä ja ottaa kaikki lääkkeet normaalisti, ellei muuta ohjetta ole annettu.
- Laita omat silmänpainelääkkeet normaalisti, mikäli niitä on käytössä.
- Pukeudu puhtaaseen ja väljään paitaan.

### Laserhoito

Laserhoito annetaan leikkaussalissa. Edeltävästi saat silmätippoja ja silmää ympäröiviin kudoksiin ruiskutetaan neulalla puudutusainetta. Puudutuksen jälkeen silmää ei pysty liikuttamaan muutamaan tuntiin. Itse laserhoito kestää 5-15 minuuttia ja on kivuton. Toimenpiteen aikana silmä pidetään auki pienellä metallisella luomenlevittimellä, laserlaitteesta kuuluu piippauksia ja voit tuntea tai kuulla pientä poksahdusta. Tämä on täysin normaalia. Toimenpiteen lopuksi silmään laitetaan vielä silmätippoja ja luomet suljetaan silmälapulla. Lappua pidetään yleensä seuraavaan aamuun asti.

**Huomioi, että välittömästi toimenpiteen jälkeen ei saa ajaa autoa!**

### Jälkihoito

Toimenpiteen jälkeen silmä on punoittava ja ärtynyt muutamia päiviä, mahdollisesti viikosta kahteen. Oireiden lievittämiseksi ja tulehduksen estämiseksi käytä silmätippoja reseptin ohjeen mukaan. Silmänpainelääkitys ja muut lääkkeet jatkuvat normaalisti toimenpiteen jälkeen, ellei hoitava lääkäri muuta ohjeista. Tulet kontrollikäynnille erillisen ohjeen mukaan.

**Jos on kysyttävää tai leikattuun silmään ilmaantuu särkyä, näön heikkenemistä tai muuta poikkeavaa, ota yhteyttä silmäpoliklinikkaan puhelin 02 313 1520.**