

Silmien fluoreskeiiniangiografia (FAG)

FAG on silmän verisuonten väriainetutkimus.

Valmistautuminen

Mainitse ennen tutkimusta, mikäli sinulla on **astma, sydänvika tai yliherkkyyttä** (mm. jodi- tai väriaineallergia).

Ennen tutkimusta molemmat mustuaiset laajennetaan yleensä silmätipoilla, minkä vuoksi **et voi ajaa itse autoa tutkimuksen jälkeen**.

Tutkimuksen suorittaminen

Tutkimuksen alussa kyynärvarren laskimoverisuoneen ruiskutetaan väriainetta, joka leviää verisuoniin. Silmiä kuvataan aluksi sekunnin, sitten muutaman minuutin välein yhteensä noin 10 minuutin ajan.

Tutkimus on neulanpistoa lukuun ottamatta kivuton, mutta kuvaus voi aiheuttaa häikäisyä.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvauksen jälkeen on usein myös lääkärin tutkimus.

Väriaineen vaikutuksesta veren ja virtsan laboratoriotutkimukset saattavat olla epäluotettavia muutaman vuorokauden ja virtsan väri on kellanoranssia.

Väriainetutkimus ei yleensä aiheuta sivuvaikutuksia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.