

SKLEROTERAPIA

Ohje tutkimukseen lähetäville ammattilaisille

QX3LT Ihonalaisen kudoksen skleroterapia

Tutkimuspaikka ja tiedustelut

Tutkimus tehdään TYKS:n toimenpideradiologian osastolla 946. T-sairaala, 4.kerros, E-siipi. Tiedustelut toimenpideradiologian osastolta puh. 02 313 3050.

Lähetete ja ajanvaraus

- Tutkimuslähete ajanvarausohjelmaan.
- Röntgenlääkäri antaa ajan tutkimuksille lähetteiden kiireellisyyden perusteella.
- Kiireellisistä päivystystapauksista on erikseen sovittava röntgenlääkärin kanssa.
- Tutkimusajan muutokset hoitaa toimenpideradiologian osasto puh. 02 313 7087.

Toimenpiteen indikaatiot ja kontraindikaatiot, riskipotilaat

- **Indikaationa** kipua tai turvotusta aiheuttavat laskimoepämuodostumat, imusuoniepämuodostumat (lymfangiomat)
- **Kontraindikaationa** varjoaineallergia, vaikeat hyytymishäiriöt, raskaus.

Valmistelu toimenpiteeseen

- Potilas saapuu osastolle edellisenä päivänä tai toimenpidepäivän aamuna.
- HUOM! Oberonaika ei ole tutkimusaika. Toimenpideradiologian osasto ilmoittaa aina tarkemman tutkimusajan.
- Ennen toimenpidettä syömättä ja juomatta neljä tuntia.
- Iv-infuusio valmiina.
- On hyvä käydä WC:ssä ennen toimenpidettä.
- Korut ja kellot jätettävä pois kuvaukseen/toimenpiteeseen tullessa.
- Esilääkkeet soitetaan toimenpideosastolta tuntia ennen toimenpidettä, tarvittaessa Diazepam 5-10mg per os, lapsilla painon mukaan.
- [Varjoaineyliherkkyyksireaktion esilääkitys](#)

Yleistä toimenpiteestä

Skleroterapiassa epämuodostumaan ruiskutetaan lääkeainetta, joka pienentää epämuodostumaa. Hoidettavaan kohteeseen pistetään neula käyttäen ultraääni ja läpivalaisuohjausta. Varjoainekuvauksella kuvataan ensin kohde. Tämän jälkeen saman neulan kautta ruiskutetaan hoidettavalle alueelle skleroterapia-aine. Toimenpide tehdään puudutuksessa tai nukutuksessa. Hoidettavasta kohteesta riippuen käytetään erilaisia puudutevaihtoehtoja.

Jos epämuodostuma on laaja, voidaan skleroterapiaa jatkaa useammalla hoitokerralla. Hoitokertojen väli on yleensä 1-2 kk.

Toimenpiteen kesto

Toimenpide kestää 1-2 tuntia.

Jälkihoito

Toimenpiteen jälkeen hoidettu alue voi olla muutaman päivän ajan kivulias ja turvoksissa. Laskimoepämuodostumat: Kipua voi lievittää tavanomaisilla särkylääkkeillä tarpeen mukaan. Lymfangioomat: Picibanil ruiskutuksen jälkeen käytetään (tarvittaessa) ainoastaan Parasetamolia kipulääkkeenä, ei NSAID kipulääkkeitä, nämä heikentävät Skleroterapian tehoa. Hoidon jälkeen on lähipäivinä odotettavissa kuumereaktio. Tähän ei ensisijaisesti käytetä antibiootteja. Tarvittaessa yhteys toimenpiteen tehneeseen toimenpideradiologiin mikäli epäselvyyttä.

Tulostus ja lausunto

Tutkimus arkistoidaan VSKK:n kuvantamiskeskuksen digitaaliseen kuva-arkistoon ja on katsottavissa esim. Carestream-ohjelmassa. Lausunto on luettavissa Webradusta.

Sädeannos [Katso STUK röntgentutkimusten säteilyannokset](#)