

Sydänlihaskoepalan otto/Sydänlihasbiopsia

Tiedustelut: sydänangio puh 32665

Yleistä toimenpiteestä

Sydämen seinämästä voidaan ottaa laskimoteitse koepaloja.

Koepala otetaan sydänlihaskoepalan ja sydänlihaskoepalan syyn selvittämiseksi, solusalpaajahoidon sydänvaikutusten seuraamiseksi tai sydänsiirtopotilaan seurannassa hylkimisreaktion toteamiseksi.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa yleensä kaulalta oikealta tai oikeasta nivustaipeesta.

Valmistautuminen ennen toimenpidettä osastolla

- Ravinnotta vähintään neljä tuntia ennen toimenpidettä. Juoda voi 2 tuntia ennen toimenpidettä.
- Normaali lääkitys, mikäli ei erikseen ole muuta määrätty.
- Esilääke: Diapam 5 - 10 mg p.o tarvittaessa.

Tarkista

- kaulan ja nivustaipeiden iho ja poista ihokarvat toimenpidealueelta.
- ettei potilas ole raskaana

Toimenpiteen jälkeen

Potilaan tulee olla vuodelevossa kaksi tuntia näytteenoton jälkeen. Mikäli näyte on otettu nivusesta, tulee punktiokohtaan painoside. Pistokohtaa tulee varoa muutaman päivän ajan välttämällä ponnisteluja, uintia ja saunaa jottei se ala vuotamaan.

Ennen kotiutusta kardiologi tekee ultraäänitutkimuksen.

Vastaus koepalasta annetaan potilaalle joko puhelimitse tai poliklinikkakäynnillä.