

Toimintaohje Vsshp:n sairaaloiden VRE-seulonnasta

Tämän ohje kumoaa aiemmat VRE-seulonnoista annetut ohjeet. Päivitetyt seulonnan kohteet on luetteloitu alla. Ohje koskee kantasairaalan lisäksi Tyks Kirurgista sairaalaa, Tyks-Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin sairaaloita sekä Turunmaan sairaalaa.

Seulonnan kohteet

1. VSSHP:n perusohjeen mukaan [Resistenttien bakteerien seulonta ja potilassiointelu akuutissa ja pitkäaikaishoidossa](#). Riskitieto poistetaan negatiivisten näytteiden jälkeen.
2. Hematologialle vuodeosastohoitoon tulevat potilaat
3. Hemodialyysissä käyville potilaille tehdään seulonta poikkileikkauksena 6 kk välein.
4. VRE-altistusriskitietomerkinnän omaavat (riskitieto poistetaan negatiivisten näytteiden jälkeen).
5. Muut tilanteet: SHYG-yksikön erikseen ohjeistamana.

Todetuista VRE-kantajista ei oteta näytteitä.

Seulontanäyte

Osastolle tullessa otetaan kahdet VRE-näytteet (kahtena eri päivänä). VRE -seulontanäyte otetaan **vain rektumista** ohjeen "[VRE ja ResGNS -seulonnan näytteenottokohdat](#)" mukaisesti (<https://hoito-ohjeet.fi/fi> – VRE ja ResGNS-seulonnan näytteenotto).

Suorien ulkomailta tulevien sairaalasiirtojen yhteydessä otetaan näytteet myös mahdollisista infektiofokuksista kuten paine- ja kroonisista haavoista, dreerien ja trakeakanyylin juurista sekä kestopatentivirtsasta (jos katetri on ollut yli viikon).

Seulottavien hoito

Seulottavat hoidetaan tavanomaisin varotoimin, eikä heitä tarvitse eristää. Poikkeuksen muodostaa ulkomailta suorana sairaalasiirtona tulevat potilaat, jotka hoidetaan kosketusvarotoimin, kunnes kaikkien resistenttien bakteerien seulontanäytteet ovat negatiivisia.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi.

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
VSSHP