

Värikalvontulehduksen (iriitin) lääkehoito-ohje

1. viikko

Kortisonitippa (esim. Dexa® tai Pred Forte®) 1 – 2 tippaa tunnin välein kipeään silmään valveillaoloaikana.

Mustuaista laajentava tippa (esim. Scopolamin®) 1 tippa 3 kertaa vuorokaudessa. Huomio: tämä tippa sumentaa lähinäköä vielä 3 – 7 päivää tipan lopettamisen jälkeenkin.

Pidä noin 5 minuutin tauko eri tippojen välillä.

Kortisonivoide Yöksi. Noin 0,5 – 1 cm nokare alaluomirakoon.

2. viikko

Kortisonitippa 1 tippa joka toinen tunti

Mustuaista laajentava tippa 1 tippa 3 kertaa vuorokaudessa.

Kortisonivoide Yöksi

3. viikko

Kortisonitippa 1 tippa 4 kertaa vuorokaudessa.

Mustuaista laajentavaa tippaa ei enää laiteta.

Kortisonivoide Yöksi

4. viikko

Kortisonitippa 1 tippa 3 kertaa vuorokaudessa.

Kortisonivoide Yöksi

5. viikko

Kortisonitippa

1 tippa 2 kertaa vuorokaudessa.

6. viikko

Kortisonitippa

1 tippa kerran vuorokaudessa.

Voit mennä yksityiselle silmälääkärille kontrolliin noin 8 viikon kuluttua lääkityksen alkamisesta, jos ei toisin mainita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.