

## **Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen**

- Ihokirurginen toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa.
- Ennen toimenpidettä saat syödä ja juoda normaalisti.
- Ennen poliklinikalle tuloa on suositeltavaa käydä suihkussa ja pestä myös hiukset.
- Mikäli leikkaus kohdistuu kasvojen alueelle, tule ilman meikkiä ja koruja.
- Jos käytät asetosalisylihappovalmisteita (Aspirin, Disperin, Primaspan), pyydämme lopettamaan lääkkeen käytön viisi päivää ennen toimenpidettä.
- Asetosalisylihappovalmisteiden käytössä ei tule pitää taukoa, jos sinulle on aiemmin asennettu (lääke)verkkoputki sepelvaltimoiden toimenpiteen yhteydessä.
- Lääkkeen voi aloittaa uudelleen toimenpidettä seuraavana päivänä.
- Haava-alueen verenvuodon välttämiseksi Marevan-lääkityksen seuranta-arvon tulisi olla alle kaksi ennen toimenpidettä. Marevan-lääkitystä ei tarvitse tauottaa, mikäli INR-arvo on alle kaksi.
- Jos käytät muita verenhennuslääkkeitä (Clopidogrel, Xarelto, Eliquis, Abixaban, Lixiana, Rivaroxaban, Pradaxa) voit jatkaa lääkitystä normaalisti ilman taukoa.

## **Toimenpiteen jälkeen**

- Toimenpiteen jälkeen pääset lähtemään heti, ellei ennalta ole toisin sovittu.