

PISARAVAROTOIMET

Tavanomaisten varotoimien lisäksi

VIERAILIJA: Ota yhteyttä henkilökuntaan ennen huoneeseen menoa.

Desinfioi kädet ennen huoneeseen menoa ja sieltä poistumisen jälkeen.



Käytä kirurgista suu-nenäsuojainta ja silmäsuojusta, kun olet alle 2 m etäisyydellä potilaasta/asukkaasta.



Korkean riskin toimenpiteissä* käytä FFP-luokan **hengityksensuojainta**. Hengityksensuojain tulee asettaa tiiviisti kasvoille ja suorittaa tiiviystesti.



Suojaimet puetaan sulkutilassa tai huoneen ulkopuolella**. Suojaimet riisutaan joko huoneen sulkutilassa tai potilas/asukashuoneessa. Hengityksensuojain riisutaan huoneen ulkopuolella.

* kts. [Hengitystievirusinfektioiden diagnostiikka ja torjunta](#) -ohje

** ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asukashuoneessa

Huoneen siivous:

Tasopinnat: Yleispuhdistusaine

Saniteettitilat ja eritteet:

Kloori 500ppm ☐ Oxivir Plus 3,5% ☐ Oxivir Excel 4,5% ☐