

Virtsarakon lääkehuuhtelu

Virtsarakkoon annettavaa lääkettä käytetään pinnallisen rakkosyövän kasvun estoon sekä tiettyjen virtsarakon tulehduksellisten tilojen hoitoon. Lääke annetaan hoitosuunnitelman mukaisesti sairaanhoitajan vastaanotolla.

Ennen lääkkeenantoa

- Anna virtsanäyte 3 päivää ennen lääkkeen antoa laboratoriossa. Näin varmistetaan, ettei ole virtsatieinfektiota.
- Virtsarakko pitää tyhjentää juuri ennen lääkkeen antoa.

Lääkkeen anto

Lääke laitetaan virtsaputken kautta virtsarakkoon katetrin avulla.

Lääkkeen annon jälkeen

- Lääkkeen annon jälkeen voit lähteä heti kotiin.
- Lääkkeen ollessa rakossa tulisi liikkua paljon.
- Lääke tulisi olla rakossa noin kaksi tuntia. Tämän jälkeen voit tyhjentää rakon.
- Juo tavallista runsaammin, jotta runsas virtsaneritys huuhtelee rakkoa.
- Tarkemman potilasohjeen saat kotiutuessa.

Ongelmien ilmaantuessa

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen.