

Laserbehandling av ögats strålkropp, syklotokoagulation

Du har fått en tid för syklotokoagulation (laserbehandling av strålkroppen). Behandlingen med laserljus riktar sig mot den så kallade strålkroppen, där kammarvätskan produceras. Syftet med behandlingen är att minska produktionen av kammarvätska och därmed sänka ögontrycket.

Förberedelse inför ingreppet

- Du kan äta och ta alla dina mediciner normalt, ifall du inte fått andra anvisningar.
- Använd ögontrycksdropparna normalt, ifall du använder sådana.
- Klä dig i en ren och rymlig skjorta

Laserbehandling

Behandlingen ges i operationssalen. Före åtgärden får du ögondroppar och man sprutar även bedövningsmedel i vävnaderna runt om ögat. Efter bedövningen kan du inte röra ögat på några timmar. Själva laserbehandlingen tar 5-15 minuter och är smärtfri. Under åtgärden hålls ögat öppet med ett litet instrument, och du kan höra pipande ljud. Detta är helt normalt. Till slut får du ännu ögondroppar och en lapp på ögat. Följande morgon kan du avlägsna lappen. **Observera att du inte får köra bil genast efter ingreppet!**

Efterbehandling

Efter behandlingen brukar ögat vara rött och irriterat några dagar, t.o.m. 1-2 veckor. För att lindra symtomen och förhindra infektion, använd ögondroppar enligt ordinationen i receptet. Ögontrycksmedicineringen och andra mediciner fortsätter som vanligt efter behandlingen om inte läkaren säger annat. Tiden för återbesök bestäms i samband med behandlingen.

Om du har frågor eller om du får värk i ögat, synen försämras eller det uppstår något annat avvikande, ta kontakt med ögonpolikliniken telefon 02 313 1520.