

Överkänslighet för värkmediciner

En del av de som lider av astma är överkänsliga för acetylsalicylsyra och för antiinflammatoriska läkemedel som påverkar med samma verkningsmekanism (sk. NSAID-mediciner). Reaktionen, till exempel astmaanfall, nässelutslag eller chock, kan förekomma oväntat.

Exempel på värkmediciner som förorsakar astmaanfall och värkmediciner för astmapatient:

Olämpliga värkmediciner

- acetylsalicylsyra
- indometacin
- fenylbutazon
- naproxen
- tolfenamsyra
- ibuprofen
- ketoprofen
- fenoprofen
- mefenamsyra
- diklofenak
- piroxicam
- meloxicam
- tenoxicam
- diflunisal
- metamizolnatrium (ensam eller tillsammans med pitofenonhydroklorid)
- tiaprofensyra
- aseklofenak
- etodolac
- ketorolac
- koksiber

Värkmediciner som vanligen passar

- paracetamol
- dekstropoxifen (inte när astmasymptom är svåra)
- petidin (inte när astmasymptom är svåra)
- oxikodon
- buprenorfin

- tramadolhydroklorid
- spasmolytika och antikolinergika (t.ex. atropinderivat utan tillägg av analgetika)
- somliga migränmediciner (t.ex. ergotamin-antihistaminkombinationer och 5HT1-receptoragonister)
- muskelrelaxantia som påverkar centrala nervsystemet (utan tillägg av analgetika)

I listan har bara den aktiva substansen nämnts. Meddela alltid om din överkänslighet för värkmediciner när läkaren ordinerar värkmedicin till dig.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.