

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

ACTH-TEST (FUNKTIONSTEST FÖR BINJURAR)

ACTH-testet undersöker binjurarnas funktion.

Patienten ges en dos testämne intravenöst enligt patientens storlek. Ämnet tvingar binjurebarken att avge kortisolhormon vars koncentration mäts med blodprov en gång före och två gånger efter testet.

För testet sätts en provtagningskanyl i patientens ena arm. Via kanylen tas alla nödvändiga prov smärtfritt. Testämnet injiceras också via kanylen i form av en snabb injektion.

Anvisningar för undersökningen:

- Införandet av kanylen känns som ett knip. Injektionsområdet kan bedövas i förväg med **EMLA-bedöningsplåster**, plåstren kan placeras i armvecket och på handryggen redan **hemma ca en timme före undersökningen**. (Obs! För barn under 1 år gamla rekommenderas inte Emla-kräm) EMLA-plåster kan köpas från apotek utan recept.
- Före undersökningen, **från och med föregående kväll klockan 22 får man varken äta eller dricka**. Vatten kan drickas rimligt (1-2 dl)
- Ifall patienten har **Hydrokortisonmedicinering**, bör man **avstå från den** kvällen och morgonen före undersökningen.
- Många läkemedel stör testresultaten. Ifall patienten har en regelbunden medicinering var god och ta kontakt för att utreda medicineringens påverkan på testet.
- Ifall barnet är sjukt (feber, svår influensa) ta kontakt för att komma överens om en ny undersökningstid.

Efter undersökningen får barnet en måltid på avdelningen. Ifall ert barn har matallergier var goda och meddela om dem i förväg till telefonnumret nedan.

Reservera ca 3 timmar för undersökningen.

Ifall ni har frågor gällande undersökningen kontakta numret nedanför.
Dagsjukhuset för barn och unga UC6 tfn 02-3131412 (må-fre kl. 13-15)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.