

Behandling av ärr med leukoplast

Leukoplast (REF no. 02322-00) är en hudtejp som innehåller zink och som fäster kraftigt på huden. Med hjälp av den försöker man förebygga alltför kraftig tillväxt av ett ärr och effektivisera ärrrets läkning. Bäst kan produkten användas på operationsärr och på små lokala kraftiga tillväxter av ärr. Leukoplast bör inte användas på öppna sår.

Bruksanvisning

- Klipp ut en lämpligt stor bit av tejp. Tejpen bör nå cirka 0,5 cm ut över det område som ska behandlas.
- Runda av hörnen på tejp, på så sätt förebygger du att det fastnar ludd från kläderna i tejp hörnen och försäkras att tejp hålls på plats.
- Innan du lägger Leukoplast på huden bör du försäkra dig om att hudområdet är rent och torrt.
- Leukoplast bör användas i cirka 7-10 dygn i sträck.
- Tejp används också under bastubad och simning.
- Byt ut tejp då den börjar lossna.
- Ta ungefär ett dygns paus i användningen och smörj under pausen in ärr flera gånger. Fortsätt med behandlingen genom att lägga en ny bit Leukoplast på området som ska behandlas.
- Behandlingens längd bedöms på ergoterapeutens mottagning.

Obs!

- Om huden går sönder under användningen av Leukoplast, det uppstår utslag eller ökande klåda bör du ta en paus i användningen. Börja använda Leukoplast på nytt i kortare perioder då hudtillståndet blivit bättre. Ifall symtomen pågår bör du sluta använda produkten.

Vid behov tag kontakt med din ergoterapeut.