

Behandling av tänder före operationen

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Infektionshärdar kan tidvis orsaka spridning av bakterier i blodcirkulationen. Dessa infektionshärdar kan förekomma på munnens slemhinna, i tandköttet, i tänderna och i käkbenet, även i käkben utan tänder. Före operationen måste munnen och tänderna vara friska. Inflammationshärdar kan vara dolda så att de kan bara upptäckas genom röntgen. Tandläkaren skall undersöka munnen och värdera behovet av röntgen. Undersökningen måste göras inom ett år före operationen.

Behandlingen av infektionshärdar ska planeras och genomföras i god tid före operationen. Man ska t.ex. i protesoperationer reservera minst fyra veckor för läkningen av hålet efter en borttagen tand.

Fäst särskild uppmärksamhet vid tandköttet och tandfästet. En infektion i tandköttet kan obemärkt ha spritt sig i omfattande grad i tänderna och vävnaderna kring dem. Rätt behandling av tandköttsinflammation kräver tid och egen aktivitet. Uppsök därför tandläkare i god tid före operationen. Det är skäl att påbörja undersökningar och behandling genast efter att operationsbeslutet har fattats.

En frisk mun förbättrar chansen att operationen lyckas. Kontinuerlig och regelbunden tandvård är viktigt också efter operationen.

Blankett för tandläkaren (tandläkaren fyller i blanketten)

I en klinisk och radiologisk undersökning fann jag inga tecken av infektionshärdar i

_____ tänder eller i käkben, som skulle hindra operationen. Också slemhinnor är friska.

Plats

Tid

Tandläkaren

