

Borttagning av förändringen i bröstkorget

Det har konstaterats en förändring i din bröstkorg, som behöver en åtgärd. Syftet med åtgärden är att säkerställa diagnosen och avlägsna förändringen. Vården på avdelningen räcker cirka 2–6 dagar.

Före operationen

Kirurgen och anestesiläkaren diskuterar med dig om den kommande operationen. Sjukskötaren intervjuar dig, i samband har du möjlighet att diskutera om saker du funderar över. Sjukskötaren går igenom bland annat uppstigningstekniken efter operationen samt andnings- och rörelseövningarna.

Före operationen får du ett kallelsebrev hem med noggranna instruktioner. Instruktionerna gäller hudrengöring, borttagning av hudbehåringen och hur du får äta eller dricka före operationen.

Under operationen

Operationen görs som titthålsoperation eller som öppen operation. Såret/såren kommer mellan revbenen. Såren sluts endera med stygn som smälter av sig själv eller stygn som bör avlägsnas vid ett senare skede.

Efter operationen

Under operationen installeras en drän in i lungsäcken, som avlägsnar blod och vävnadsvätska från operationsområdet och lungsäcken. Kirurgen avlägsnar dränen 1–2 dygn efter operationen, när sekretmängden är måttlig och det eventuella luftläckaget har slutat.

Såret observeras dagligen. Sårets omgivning kan svälla upp i synnerhet under armhålan. Svullnaden kan vara i några veckor.

Det är väldigt viktigt att andas effektivt efter operationen. Med tanke på rehabiliteringen är det viktigt att bevara axelledens rörlighet på den opererade sidan och en god hållning. Du får handledning av fysioterapeuten.

En lyckad smärtlindring påskyndar din återhämtning. Man ber dig beskriva smärtan/smärtfriheten med hjälp av smärtmätare på skalan 0–10 och vid behov får du extra smärtmedicin.

Under operationsdagen får du intravenös vätskedropp, följande dag får du äta och dricka normalt.

Hemma efter operationen

Sjukskrivningen är 2–6 veckor, beroende på operationens omfattning och yrke. Motionering försnabbar återhämtningen och höjer humöret, så det är bra att börja med utomhusmotion direkt efter hemförloven. I början kan du göra korta promenader 1–3 gånger om dagen, du kan öka på promenadens längd då krafterna förbättras.

I bastu får du gå två veckor efter operationen om såren har läkt helt.

Ifall du röker, är det väldigt viktigt att sluta. Du bör ändå vara utan att röka 4 veckor före operationen, eftersom rökning ökar operationsriskerna och fördröjer återhämtningen. Hjälpsmedel för att sluta röka får du vid behov av vårdaren för abstinenssymptom. Kontaktuppgifter till vårdaren för abstinenssymptom får du på avdelningen, ifall du är villig att använda tjänsten.

Det rekommenderas att använda smärtmedicin mot sårsmärta vid behov enligt läkarens direktiv.

Ifall det uppkommer infektionssymptom runt såret (rodnad, hetta och bildning av sekret) eller du får feber (över 37,5 grader), kontakta den vårdande enheten.

Efterkontroll

Efterkontrollen bestäms på basen av operationsfyndet. Efterkontrollen kan endera ske på lung- eller cancer polikliniken cirka 1 månad efter operationen. En del av patienterna får en separat ringtid vid hemskrivningen.

Ifall det uppkommer i den slutliga mikroskopiundersökningen (PAD), att det är fråga om cancer, kan du bli ordinerad strålbehandling eller/och läkemedelsbehandling. Kallelsen till dessa behandlingar får du senare per post.

Under sjukhusvistelsen kan du vid behov diskutera med socialskötaren om till exempel sjukhuskostnaderna samt saker angående ersättningar och cancerföreningens verksamhet.

Krya på dig!