

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

BOTULINUMTOXINVÅRD AV URINBLÅSAN

Botulintoxin används som vård av överaktiv urinblåsa och muskelsammandragningar i slutarmuskeln. Under åtgärden injiceras botulintoxin på flera ställen under slut- och blåsmuskeln. Medicinen inverkar så att den överaktiva urinblåsans vägg slappnar av och minskar de besvärande symptomen som annan medicin inte påverkat tillräckligt eller om man inte tål medicineringen. Urininkontinensen avtar inom några veckor efter vården och effekten varar individuellt 2-9 månader.

Före åtgärden

- ge ett urinprov enligt anvisningarna i kallelsebrevet
- utför en ordentlig intimitvätt hemma före du kommer på åtgärd

Åtgärden

Åtgärden görs endoskopiskt via urinröret antingen under nedsövning eller i lokalbedövning. Åtgärdens längd är 30 minuter. Åtgärden görs dagkirurgiskt, du kommer alltså till sjukhuset på morgonen och får åka hem samma dag.

Efter åtgärden

Det kan förekomma blod i urinen och lindrig smärta i blåsan, men symptomen lättar rätt snabbt. Du kan använda värkmedicin vid behov.

Eftervård

Eftervården och en möjlig efterkontroll bestäms individuellt enligt anvisningar av läkaren som utfört åtgärden.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.