

COVID-19 skyddsåtgärder vid vårdåtgärder som orsakar aerosoler



- Skyddsutrustning vid aerosol-orsakande vårdåtgärder:
 - FFP2 eller 3-andningsskydd
(Obs! Täthetstest varje gång skyddet tas på.
anvisning: [Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen](#))
 - skyddsglasögon/helansiktvisir
 - skyddsrock
 - skyddshandskar
 - vid behov hårskydd
- Vårdåtgärder som orsakar aerosoler är bl.a.
 - sugning av slem från luftvägarna med öppen teknik (inkl. vård av trakeostomi)
 - icke-invasiv ventilation så som C-PAP, BI-PAP
 - Högflödes-syrgasbehandling så som Airvo- och Optiflow
 - nebulisatorbehandling
 - bronkoskopi
 - intubation
 - resuskitation
 - obduktion
 - skopiundersökning av övre GI-kanalen, mun-, näs- och öronkirurgi, ansiktsskurgi
 - Tandsvårdens roterande instrument och trevägsprutor (anvisning THL)




Efter varje vårdåtgärd byts handskena i patientrummet till rena, samtidigt desinficeras händerna

COVID-19 – misstanke eller bekräftat fall ANVÄNDNING AV SKYDDSUSTRUSTNING VID SITUATIONER SOM ORSAKAR AEROSOLER

- Skyddsutrustningen kläds på i slussen eller utanför patientrummet.
- **Samtliga** som går in i rummet använder skyddsutrustning:




1. Förbered en plastpåse/kärl för skyddsutrustning avsett för flergångsbruk.
2. Desinficera händerna.
3. Klä på andningsskyddet (FFP2/FFP3). Kom ihåg täthetstestet!
4. Desinficera händerna.
5. Klä på skyddsrocken.
6. Kläd vid behov på ett hårskydd.
7. Ta på skyddsglasögon eller ett helansiktesvisir.
8. Desinficera händerna.
9. Byt vid behov till tvättbara skyddsskor utanför patientrummet.
10. Desinficera händerna.
11. Skyddshandskarna tas på före kontakt med patienten eller hans omgivning



Efter varje vårdåtgärd, beröring av patienten/hans omgivning så tas handskarna bort, händerna desinficeras och byts vid behov till nya inne i patientrummet.

COVID-19 – misstanke eller bekräftat fall

Avklädning av skyddsutrustning efter vårdåtgärder som orsakar aerosoler



Skyddsutrustningen tas av i slussen.

Såvida en sluss inte är i användning så tas skyddshandskarna och skyddsrocken av inne i patientrummet. Skyddsglasögon/helansiktesvisir, hårskydd och andningsskydd tas av utanför patientrummet.

1. Ta av skyddshandskarna. **Desinficera händerna.**
2. Ta av skyddsrocken. **Desinficera händerna.**
3. Om en sluss inte är i användning, gå ut ur rummet.
4. Såvida skilda skyddsskor har varit i användning så sätts de i den färdigt öppnande påsen/kärlet utan att beröra dessa med händerna. Sätt på de egna arbetsskorna.
5. **Desinficera händerna.**
6. Ta av helansiktsvisiret (om sådant har varit i användning). Sätt flergångsmaterial/tvättbara skydd i påsen/kärlet för rengöring. **Desinficera händerna.**
7. Ta av hårskyddet. **Desinficera händerna.**
8. Ta av skyddsglasögonen (såvida dessa har varit i användning). Sätt flergångsmaterial/tvättbara skydd i påsen/kärlet för rengöring. **Desinficera händerna.**
10. Ta på skyddshandskar.
11. Ta av FFP2/FFP3-andningsskyddet.
12. Ta av skyddshandskarna.
13. **Desinficera händerna.**

**Rengör flergångsmaterial/
rengöringsbar skyddsutrustning
enligt överrenskommelse
antingen genom
värmedesinfektion eller genom att
torka med desinficeringsmedel**