

## Dapson®

Den aktiva substansen dapson i Dapson® är ett antibakteriellt läkemedel som hör till gruppen sulfonamider. Ursprungligen utvecklades det för behandling av spetälska. Nuförtiden används det för olika hudsjukdomar, såsom hudceliaki (dermatitis herpetiformis), vaskuliter och systemisk lupus erythematosus. Behandlingens verkan baserar sig inte på den antibakteriella effekten, utan läkemedlet stävjar infektionsreaktionen som de vita blodkropparna förmedlar.

### Användning

- En tablett innehåller 50 mg dapson. Dygnsdosen varierar mellan 50 och 200 mg.
- Initialdosen är 50–100 mg per dag. Doseringen minskas under behandlingens gång till den minsta verkande dosen.
- **Använd alltid läkemedlet enligt läkarens ordination.**

### Graviditet och amning

- I allmänhet anser man att användning av dapson under graviditet är tryggt för både mamma och foster. Man strävar likväl efter att undvika dapson under graviditet om möjligt.
- Om det är nödvändigt för dig att använda dapson under graviditeten, rekommenderar man att du dessutom använder folsyra.
- Dapson går igenom moderkakan och passerar över till modersmjölken. Det är viktigt med noggrann uppföljning av barnet om du använder dapson under amningen.
- Dapson kan minska spermimängden och deras motilitet.

### Oönskade effekter

- Dapson kan orsaka anemi.
- Ovanligare oönskade effekter är leverbesvär, feber, utslag, förstörade lymfkörtlar, rubbningar i funktionen av det perifera nervsystemet, psykiska störningar och lindriga tarmsymtom.

### Att beakta

- Om det under behandlingen förekommer symtom på plötslig förkylning såsom feber, halsont och sårnader i munnen, ska behandlingen genast avbrytas och blodstatus kontrolleras.

- En del patienter med sulfonamidallergi får också allergiska symtom av dapson. Försiktighet ska iakttas med patienter som har en hjärt-, lung-, lever-, eller njursjukdom eller anemi.

## **Uppföljning**

- Under medicineringen följer man upp blodstatus samt leverns och njurarnas funktion med blodprov.
- Uppföljande blodprov tas först med två veckors intervaller, senare görs uppföljningen mer sällan.

## **Dapson och andra läkemedel**

- Dapson kan interagera med en del läkemedel.
- Informera alltid din behandlande läkare om Dapson®-medicineringen.