

Datortomografistyrdd benbiopsi

Ni kommer till en datortomografistyrdd provbitstagning.

Hur förbereder du dig undersökningen?

Det reserveras plats till dig på bäddavdelningen på grund av att du efter åtgärden behöver vila och få eftervård.

- På undersökningdagen bör du varken äta eller dricka.
- Före undersökningen bör man hålla paus från vissa läkemedel, till exempel Marevan. Från avdelningen ges närmare information om läkemedlens paus.
- Före åtgärden undersöks blodets P-INR, trombocyter och hemoglobin. Du får instruktioner om blodprovstagningen från avdelningen.

Om du är gravid eller misstänker att vara det, ber vi dig informera detta till den remitterande enheten.

Hur utförs åtgärden?

Anestesiläkaren övervakar åtgärden. Anestesiläkaren bestämmer individuellt om nödvändig mediciner. Under åtgärden skall du ligga stilla på undersökningbordet. Undersökningsställningen försöker man få så bekväm som möjligt.

Före provtagningen tas bilder av provtagningsstället. När en lämplig punkt för provtagning har klarlagts, tvättas huden med ett antiseptiskt medel. Stickområdet bedövas med lokalbedövning och därpå ger läkaren vid behov mera mediciner.

Röntgenläkaren tar nödvändiga prov med en biopsinål och emellanåt tas bilder för att kontrollera nålens position.

Hur länge tar undersökningen?

Åtgärden tar 30–60 minuter.

Efter undersökningen

Efter åtgärden bedömer åtgärdsavdelningen individuellt hur långt sängläge behövs. Du förs i vågrätt position till avdelningen för observation. Anestesiläkaren bestämmer om hurdan observation anestesin kräver.

Var får du höra resultaten av undersökningen?

Den remitterande enheten informerar om undersökningsresultaten och eventuella fortsatta åtgärder.