

ERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångar

ERCP är en röntgenundersökning av gall- och bukspottskörtelgångarna. Med hjälp av undersökningen kan man fastställa sjukdomar i gallvägarna och i bukspottskörteln. Man kan även göra vårdåtgärder i samband med undersökningen. Undersökningen görs med ett böjligt endoskop via munnen till magsäcken och därifrån till första delen av tunntarmen. I undersökningen används röntgengenomlysning och kontrastmedel.

Före undersökningen

- Kontakta den vårdande enheten i förväg ifall du använder mediciner som påverkar blodets koagulering (bl.a. Primaspan®, Marevan®, Xarelto®, Eliquis®, Omega-3®)
- Före undersökningen får du inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen innan.
- Morgonmedicinen får tas klockan 6 med en liten mängd vatten.
- Meddela personalen ifall du vet om att du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du har några andra allergier.
- På grund av genomlysningen måste en eventuell graviditet utredas före undersökningen.
- Före undersökningen sätter man en kanyl i din arm.

Undersökningen

- Du ligger på sida på undersökningsbordet under undersökningen.
- Svalgen bedövas med bedövningsspray.
- Värk- och lugnande medicin ges via kanylen ges.
- Andningsvägarna hålls öppna under hela undersökningen.
- Undersökningen räcker ungefär 20-60 minuter.

Efter undersökningen

- P.g.a. medicineringen kan svalgen kännas bedövad och du kan känna dig sömnig efter undersökningen.
- Om du mår bra får du äta och dricka cirka två timmar efter undersökningen.
- Efter undersökningen uppföljs ditt hälsotillstånd på avdelningen för eventuella biverkningar eller komplikationer.
- Kraftig smärta i magen och temperaturstegring kan vara tecken på komplikationer. Dessa behandlas vanligtvis lätt utan ytterligare åtgärder och kräver bara några tilläggsdagar på sjukhuset.

Utskrivning och efterkontroll

- Du blir utskriven antingen samma kväll eller följande dag, beroende på ditt mående.
- Du ska ha en följeslagare senast klockan 15 ifall du får åka hem samma dag.
- Eventuell efterkontrolltid får du i samband med utskrivningen.

Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall du får

- Kraftigt magont, som inte blir bättre med värkmediciner
- Blodig uppkastning
- Svart avföring
- Över 38 grader feber