

Efter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteterna

Kontrastmedelundersökning av artärerna (angiografi) i nedre extremiteterna görs via ljumskens artär och i samband med undersökningen punkteras lårbenartärens vägg. I samband med avbildningen kan det göras behandlingar som korrigerar artärblodcirkulationen, såsom ballongvidgning, insättning av stent (rörformat metallnät) eller upplösning av blodpropp (tromb).

Efter utskrivning från sjukhuset

- Lindriga blåmärken vid insticksstället är ofarliga.
- Dagen efter åtgärden får förbandet tas bort och efter det får du duscha.
- Bastubad är tillåtet en vecka efter åtgärden.
- Att dricka rikligt de två första dygnet försnabbar kontrastmedlets eliminering.
- Akta och uppfölj insticksstället en vecka. Undvik tung ansträngning och lyft.
- Det är förbjudet att röka p.g.a. åderförkalkning (ateroskleros) och för återhämtningen efter åtgärden, vid behov kan nikotinersättningspreparat användas.

Kontakta juren eller i nödfall alarmcentralen om det vid insticksstället

- Blöder → Tryck kraftigt på insticksstället
- Bildas ett stort hårt blåmärke
- Känns kraftig smärta

Det har möjligtvis placerats en tryckapparat eller kompressionsdyna (hemostasdyna) på punktionsstället och vid behov ges tilläggsanvisningar angående dessa.