

Elkonvertering (kardioversion)

Med elkonvertering behandlas rytmrubbningar som t.ex. förmaksflimmer och förmaksfladder.

Förberedelser inför ankomsten till sjukhuset

- Under Marevan® behandling bör INR-värdet vara över 2 tre veckor i rad före åtgärden. Kontrollering av INR-värdet en gång i vecka är väldigt viktigt, eftersom åtgärden inte kan göras om INR-värdet inte varit på vårdnivå.
- Under Pradaxa®, Lixiana®, Eliquis® och Xarelto® behandling, bör läkemedlet tas regelbundet dagligen minst 3 veckor före åtgärden. Medicineringen fortsätter minst 3 veckor efter åtgärden.
- Om rytmen återgår av sig själv till normalrytm, INR-värdet går under 2 eller om något av ovannämnda läkemedlen blivit o tagna, kontakta din vårdande enhet så snabbt som möjligt.

Risk för att insjukna i hjärninfarkt i samband med kardioversion är förhöjd, om inte ovannämnda läkemedels instruktioner följts.

Åtgärdsdagen

- Var oäten och odrucken minst 6 timmar innan åtgärden. De tillåtna medicinerna kan tas med lite vatten, helst 2 timmar före åtgärden. Separat instruktion av de tillåtna medicinerna får du med kallelsen.
- Inför åtgärden sätts en kanyl, via kanylen ges vätska och mediciner. Du kopplas också till en övervaknings monitor och du får syre via en syremask.
- Kardioversionen sker under en kort nedsövning, via elektroder som placerats på bröstet, genom elektroderna ges en liten elchock till hjärtmuskeln för att återfå den normala hjärtrytmen.

Efter åtgärden

- Efter kardioversionen kommer du att stanna sjukhuset i några timmar för observation och du får litet mellanmål.
- I allmänhet sker utskrivningen på samma dag, men förbered dig på att vid behov efter åtgärden stanna på sjukhuset över natten för observation.
- **Notera att redan då du anländer till sjukhuset att det är förbjudet att köra bil på åtgärdsdagen.**

Ibland händer det att rytmen inte återgår till den normala hjärtrytmen, utan förblir vid förmaksflimmer eller fladder. Vid dessa situationer diskuterar läkaren vilken vård som skulle vara lämpligast för att behandla din rytmstörning.

Sydänsairaudet.fi bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.