

Endovaskulär korrigerig av bukaortaaneurysm

Bukaortaaneurysm (pulsåderbräck på stora kroppspulsådern i magen) är ofta symptomfri och hittas av en slump i samband med andra undersökningar. Det är frågan om artärväggens svaghet som påverkas av bl.a. åderförkalkning (ateroskleros), genetiska anlag, sällsynta bindvävssjukdom och kroniskt inflammationstillstånd i blodåderns vägg. Operationen görs intravenöst genom att använda en kärilprotes.

Före operationen

- Du får inte äta eller dricka dagen före operationen from klockan 24.
- Det rekommenderas att dricka cirka 1,5 liter vatten dagen före operationen.
- Tvätta dig på kvällen före operationen, var speciellt noggrann med att tvätta operationsområdet, ljumskarna och naveln.

Operationen

Operationen utförs under nedsövning eller bedövning. Under operationen läggs en kärilprotes in i den drabbade artären från pulsåderna i ljumskarna, då bildas en ny rutt för blodcirkulationen.

Efter operationen

- Det är tillåtet att duscha dagen efter operationen. Bastubad är förbjudet 2 veckor.
- För att rehabiliteringen skall komma i gång är det viktigt att stiga upp och röra på sig.
- Undvik ansträngning under en månad, efter det får man fortsätta motionera som förut.
- Till exempel paracetamol -värkmedicin kan användas för smärta i såret.
- Utskrivningen från sjukhuset sker oftast på tredje dagen. Längden på sjukledighet är 4 veckor.
- Efter operationen påbörjas det livslång kolesterolmedicinering och medicin som förhindrar blodets koagulering.
- För att få ett permanent vårdresultat är det förbjudet att röka. Det är tillåtet att använda nikotinersättningsprodukter vid behov.
- Efterkontroll (besök eller telefontid samt datortomografi) görs efter en månad och därefter årligen.
- Du får skilda anvisningar angående sårvård och borttagning av suturer.
- Nämn operationen åt läkaren ifall det under de 6 följande månaderna görs åtgärder i munnen eller svalget, skopi av lungvägarna eller ifall du har någon inflammation, så att man kan påbörja skyddande antibiotika.

Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall

- Benet blir sjukt, muskelfunktionen och känseln i benet försvagas gradvis, det kan vara frågan om blodpropp och då är situationen allvarlig.
- Om såret blir rött, svullet och tar sjukt eller ifall du får feber.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.