

Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepp

- En kirurgisk behandling av huden görs under lokalbedövning.
- Före åtgärden kan du äta och dricka normalt.
- Före ankomsten till polikliniken rekommenderar vi att du duschar och att du även tvättar håret.
- Ifall operationen riktar sig till ansiktsområdet, kom utan smink och smycken.
- Ifall du använder preparat med acetylsalicylsyra (Aspirin, Disperin, Primaspan), ber vi att du slutar använda medicinen fem dagar före åtgärden.
- Användning av preparat med acetylsalicylsyra ska inte avbrytas, ifall man tidigare har satt in en läkemedelsavgivande stent i samband med en kransartäråtgärd.
- Du kan på nytt inleda medicinen dagen efter åtgärden.
- För att undvika blödning från sårområdet, ska Marevan-medicineringens uppföljningsvärde vara lägre än två före åtgärden. Du måste inte pausa Marevan-medicineringen om INR-värdet är lägre än två.
- Ifall du använder andra blodförtunnande mediciner (Clopidogrel, Xarelto, Eliquis, Abixaban, Lixiana, Rivaroxaban, Pradaxa), kan du fortsätta med medicineringen normalt utan paus.

Efter ingreppet

- Efter åtgärden får du genast åka hem, om inte annat överenskommit tidigare.