

Glycerolbedövning av trillingnervens knuta

Det har reserverats tid till Er för glycerolbedövning av trillingnervens knuta. Eftersom åtgärden kräver såväl förberedelser som eftervård, har det även reserverats plats till Er på bäddavdelningen.

Vad är syftet med glycerolbedövning?

Syftet med bedövningen är att lindra värk i trillingnerven. Bedövningen kan verka i flera år och åtgärden kan vid behov förnyas.

Hur förbereder Ni Er för åtgärden?

- Ni kommer till sjukhuset på undersökningsagens morgon.
- Läkemedel (Marevan) som påverkar blodets koagulationsfaktorer bör, med den vårdande läkarens samtycke, avslutas 3 dygn före undersökningen. Andra läkemedel som påverkar blodcirkulationen avslutas 7 dygn före åtgärden.
- **På undersökningsdagens morgon bör Ni vara oäten.**
- Smycken från det område som skall undersökas bör tas bort före undersökningen.

Hur går åtgärden till?

Åtgärden utförs av en neurokirurg, som assisteras av en röntgenskötare. Vid behov är en röntgenläkare också närvarande vid undersökningen.

Huden på kinden bedövas. Genom kindens hud in i nervganglionet injiceras glycerol med hjälp av en tunn nål. Injiceringspunkten kontrolleras med hjälp av röntgenstrålar.

Efter åtgärden

- Åtgärden tar ca 15 minuter. Efter det bör Ni sitta stilla framåtböjd i fyra timmar, så att bedövningsmedlet (glycerol) hålls på rätt ställe. Därefter får du äta och vara uppe normalt
- Ni får åka hem dagen efter åtgärden.