

## Gynekologisk behandling med elektrisk slinga

Genom en behandling med en elektrisk slinga (LEEP) avlägsnas förstadier av cellförändringsområden i livmodermunnen.

### Tidsbokning

Vårdtiden skickas per post eller man kommer överens om den på poliklinikbesöket. **Man försöker undvika vård under mensesen.** Du skall vara i kontakt ifall du **har riklig blodig flytning.**

Om du använder **preventivpiller, fortsätt med dem utan paus** så, att du helst inte blöder efter behandlingen minst under 2 veckor, men gärna inte under 4. Du kan fråga råd om hur man kan flytta mensesen från din vårdenhet.

### Behandling i elektrisk slinga

**Ta smärtmedicin en timme innan du kommer till behandlingen.** Behandlingen kräver ingen uppföljning på sjukhuset eller sjukledighet.

Vid behandling med elektrisk slinga, lokaliserar cellförändringsområdet med hjälp av kolposkopi, ättika- och jod färgningar varefter livmodermunnen bedövas. Cellförändringen avlägsnas med den elektriska slingan. Du kan känna en lindrig mensvärksaktig smärta under behandlingen. Den avlägsnade biten skickas till patologen för vidare undersökningar.

### Återhämtningen hemma

Efter åtgärden kan du ännu hemma känna lindrig smärta. För eventuell smärta kan du ta receptfria smärtstillande mediciner.

Det är vanligt med lindrig blodig flytning **efter behandling med elektrisk slinga.** Det uppstår **en skorpa på behandlingsområdet, som lossnar inom 1 - 2 veckor från behandlingen och då kan även mer blödning förekomma.** På grund **ökad infektions- och blödningsrisk** skall man undvika simning, karbad, användning av tamponger och menskopp samt samlag ända till nästa mens.

### Uppföljning

Om provsvar och eventuell fortsatt vård kommer man överens individuellt.

Ta kontakt med din vårdenhet om efterblödningen blir rikligare eller illaluktande, du får feber eller smärta i underlivet.