

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hemvårdsanvisningar för febermedicin

Barnets namn: _____

Vikt: _____

Datum: _____

Medicindosen räknas enligt barnets nuvarande **vikt**. För liten dosering sänker inte febern.

Paracetamoldos 15 mg/kg

* För alla åldrar * Dosintervall 6 - 8 timmar

- Oral lösning:
- Stolpiller:
- Tablett:

Vanligtvis räcker en medicin för feber! För barn med hög feber kan man ge två febersänkande mediciner samtidigt. **Säkra alternativ är:**

- paracetamol + ibuprofen
- paracetamol + naproxen

Obs.: **Ibuprofen och naproxen** stärker varandras verkan negativt så man **FÅR INTE använda dem samtidigt** i barnets medicinering.

Ibuprofendos 10 mg/kg

* För barn över 3 månader * Dosintervall 8 timmar

- Oral lösning:
- Stolpiller:
- Tablett:

ELLER



Naproxendos 5 mg/kg

* För barn över 1 år * Dosintervall 12 timmar
*receptbelagd medicin

- Oral lösning:

Oral lösning

Lättaste och noggrannaste doserings sättet.
Absorberas jämnt och snabbt.
För barn i alla åldrar, även spädbarn.


Tablett som absorberas i munnen

För barn över 1 år.
Alternativ för tablett med hård yta.
Kan lösas upp i en sked vatten.



Tabletter med hård yta

Barn över 4 år kan vanligtvis redan svälja säkert .
Halverings- och fördelningsmöjlighet endast enligt brytskåorna.
Får inte söndersmulas eller lösas upp i vatten.



Stolpiller alltså suppositorium

Alternativ för spädbarn och små barn.
Kan halveras på längden, så att medicinämnet i stolpillret delas jämnt.

Att observera under barnets febevård

Temperaturen av barn under 1 år kan mätas från **ändtarmen** och **över 38 °C** räknas som feber. Äldre barns temperatur mäts från armhålan och **över 37,5 °C** räknas som feber.

Det är **viktigt att dricka** tillräckligt för att kompensera avdunstningen orsakat av febern. Ett barn med feber vill oftast inte äta något, så det är inget att bekymra sig över, om barnet annars mår bra.

Man kan svalka ner ett febrigt barn genom att lätta på klädsel och täcken. Barnet mår allmänt bra om hen kvicknar till och orkar vara aktiv efter att febern sjunkit. Ifall barnet fortsätter att vara trött, kraftlös, sjuk eller inte urinerar **efter att febern sjunkit** bör barnets tillstånd bedömas av en **läkare**.

Barn under 3 månader med feber behöver alltid en **läkares** bedömning.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.