

## Hyvling av tumör i urinblåsan

Urinblåsecancer är den allmännaste elakartade tumören i urinvägarna. Blåscancer är vanligare hos män än hos kvinnor och den vanligaste riskfaktorn är rökning. Val av behandlingsform påverkas av tumörens tillväxtsätt; om den är ytlig, lokalt trängd in i blåsväggen eller längre utspridd, samt patientens kondition.

### Åtgärden

Hyvling av tumören i urinblåsan görs vanligtvis under nedsövning. I samband med åtgärden sätter man in en urinkateter som hålls kvar 1-3 dygn beroende på omfattningen av hyvlingen och mängden blod i urinen. Tumören som hyvplats från blåsan skickas till patologen för undersökning.

### Efter åtgärden

- Sveda vid urinering, irritation i urinblåsan och blodig urin kan förekomma i 2-4 veckors tid.
- Skorvarna lossnar från åtgärdsområdet efter 2-3 veckor, då kan urinen bli tillfälligt blodig och det är en normal följd av åtgärden. Då är det viktigt att dricka rikligt (1,5 liter/dygn) ifall du inte har begränsningar i vätskeintaget p.g.a. någon annan sjukdom.
- Kraftig ansträngning är förbjudet i fyra veckors tid för ansträngningen kan leda till blödning.
- Det är inte tillåtet att bada bastu på två veckor.
- Ifall du har symptom på urinvägsinfektion (sveda, tätt urineringsbehov) skall du föra ett urinprov till den egna hälsocentralen. Vid behov påbörjas en antibiotikakur.

### Eftervård

I början kontrolleras situationen med endoskopi med 3-4 månaders mellanrum. Efter det kan man förlänga endoskopiintervallet. Den fortsatta vårdplanen beror på patologens svar.