

Inläggning av stentgraft vid aneurysm i aorta descendens

Det har konstaterats en förändring (aneurysm) i den nedåttigande delen av aorta i bröstkorgen. För att minska risken för bristning och blödning av pulsåderbråcket har det bokats en tid för en endovaskulär operation där man korrigerar den skadade delen av kärlet med ett så kallat kärlgraft.

Före ankomsten till sjukhuset


- Huden kring armhålorna och ljumskarna bör vara i gott skick.
- Du får en skild anvisning om medicineringen i kallelsebrevet
- Kontakta Hjärtavdelning 2 (telefon 02 313 7950) på vardagar klockan 8.00–15.00 , ifall du är osäker om medicineringen och dess paus.

Före åtgärden

- Man tar blodprov och eventuellt en lungröntgen bild.
- Duscha kvällen innan operationen.
- Du ska vara oäten samt ej dricka från och med klockan 24.00 natten före operationen.
- Hudbehåringen avlägsnas från ljumskarna, vänstra armhålan och bröstkorgen på operationsmorgonen.

Under åtgärden

Åtgärden sker under narkos (nedsövning) på operationsavdelningen. Inför operationen sätts en kanyl, via kanylen ges vätska och medicine samt man sätter även en urinkateter. Åtgärden utförs via båda ljumskarna och vänstra armhålen genom små hudsnitt. Via dessa blodkärl förs kärlgraften på plats.



Efter åtgärden

- Ditt mående följs med på uppvaket, varifrån du sedan flyttas till hjärtavdelningen.
- Efter åtgärden kan du få feber, vilket är en normal reaktion orsakad av ett främmande föremål (kärilprotesen).
- Det är vanligt och ofarligt att det uppstår blåmärke på operationsområdet.
- Hemförlovningen och eftervård sker individuellt enligt läkarens anvisningar.

[Sydänsairaudet.fi](https://sydänsairaudet.fi) har information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.