

Intravesikal Emda Mitomycin-C-behandling

Syftet med behandlingen är att förebygga återfall och framskridning av urinblåsecancer.

Förberedelser inför behandlingen

- För ett urinprov till hälsovårdscentralen tre dagar före den **första** behandlingen.
- Därefter behöver du bara ta ett urinprov om du har symtom på urinvägsinfektion. Symtom på urinvägsinfektion kan vara att urineringsbehovet är tätare, det kan förekomma sveda eller smärta vid urinering, du får feber eller smärta i nedre delen av buken, eller urinen kan lukta starkt. Ifall det finns en infektion i urinen blir du kontaktad från sjukhuset. Vid behov vårdas infektionen med antibiotika innan behandlingen fortsätter.
- Du får saltabletter från sjukhuset som tas enligt följande:
 - föregående kväll tas 1,5 gram saltabletter (antingen 3 x 500 mg eller 2 x 750 mg)
 - på dagen för behandlingen tas 1,5 g saltabletter 30 minuter före behandlingen.
- Drink inget 8 timmar före behandlingen.
- Du får äta normalt på morgonen.
- Du får ta dina morgonmediciner som normalt, ta eventuella vätskedrivande mediciner först efter behandlingen.

Genomförandet av behandlingen

- Urinblåsan töms före behandlingen med hjälp av en urinkateter, samma kateter används för att sätta in medicinen i blåsan.
- Man leder lågspännig elektrisk ström (25 mA) till urinblåsan med hjälp av katetern och EMDA-apparatur.
- Åtgärden räcker 30-40 minuter under vilken du kan känna ryckande eller kittlande känsla i magens nedre del. Behandlingen orsakar inte smärta.
- Efter behandlingen tas medicinen bort med hjälp av katetern och därefter avlägsnas katetern.
- Det är bra att reservera en timme för behandlingen.

Efter behandlingen

- Drink rikligt efter behandlingen (från 2 timmar efter behandlingen) för att skölja urinvägarna.
- Den möjliga blodiga urinen försvinner oftast genom att dricka rikligt.
- Behandlingen kan orsaka:
 - Klåda, värmekänsla och nypande känsla på huden

- Rodnad på huden av magens nedre del som räcker vanligtvis max 24 timmar.
- Ökat urineringsbehov eller blodig urin som försvinner av sig själv.
- Sveda i urinröret och hudirritation runt könsorganen.
- Du kan ta värkmedicin vid behov.
- För att det inte skall bli kvar medicin på huden är det speciellt viktigt att tvätta händerna och könsorganen varje gång du urinerat 2 dygn efter behandlingen. Efter toalettbesök skall WC-byttan sköljas två gånger med locket stängt.
- För att undvika stänk rekommenderas att även män sitter ner och urinerar.
- Använd kondom för att skydda din partner eller avstå från att ha samlag under en veckas tid.

Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall

- Du får över 38°C feber
- Urinen är kraftigt blodig
- Ditt allmäntillstånd försvagas
- Berätta om behandlingen ifall du misstänker att symptomen beror på EMDA-MMC vården.