

Kemoembolisering av levertumör (TACE-behandling)

Under behandlingen blockeras levertumörens eller – metastasens blodcirkulation genom att blockera leverartärens förgreningar med flytande och fast substans. Åtgärden görs under genomlysning, alltså används röntgenstrålning och jod kontrastmedel. För att uppnå ett tillräckligt vårdresultat upprepas åtgärden om 4-6 veckor och vid behov även flera gånger.

Förberedelser inför åtgärden

- Du får inte äta, dricka eller röka sex timmar före åtgärden.
- Mediciner kan tas på morgonen före åtgärden med en liten mängd vatten, ta inte vätskedrivande medicin eller diabetesmedicin i tablettform.

Åtgärden

- Åtgärden räcker cirka tre timmar med förberedelser.
- Åtgärden är inte smärtsam.
- En kateter förs in via ljumskartären till den gren av leverartären som försörjer tumören. Via katetern sprutas cytostatika och blockerande medel tills tumörens blodcirkulation försvagas. Vårdresultatet kontrolleras via röntgenavbildning.
- Biverkningar är sällsynta. Oftast handlar de om problem med punktionsställets blödning eller ytterst sällsynta skador på ådern eller överkänslighet mot läkemedlet.

Efter åtgärden

- Som en biverkning av åtgärden kan det förekomma stegring, illamående, smärta eller förhöjda infektionsparametrar, vilka vårdas symptomatiskt.
- Sängvilans längd är beroende av hur punktionsstället har förseglats, från två timmar och uppåt.
- Ditt tillstånd följs först upp i uppvaket och sedan på bäddavdelningen.
- Om ditt tillstånd är bra kan du få åka hem följande dag.
- Förbandet på punktionsstället skall hållas torrt ett dygn.
- Lyft av tunga bördor, kraftig motion och bastubad skall undvikas fem dagar.

Om det uppstår problem

- Kontakta hälsocentralen, den vårdande enheten eller juren ifall det förekommer blödning, smärta, svullnad eller allergiskt utslag i punktionsstället.