

Koldioxidlaserbehandling av hudförändringar som orsakar hidradenitis suppurativa-sjukdom

Koldioxidlaserbehandling genomförs under lokalbedövning och du kan gå hem omedelbart efter åtgärden, om inget annat har avtalats.

Eftervård

- Efter laserbehandlingen kvarstår en såryta på hudområdet. Beroende på det behandlade områdets djup och den behandlade punkten sluts området efter ca 3-4 veckor.
- I det tidiga skedet ömmar sårytan och avsöndrar vävnadsvätska, möjligen även blod. Under denna tid ska området sprayas med rikligt med ljumt vatten åtminstone en gång om dagen.
- Efter sprayningen kan antibakteriell salva smörjas på sårytan (Fucidin).
- Som sårförband kan användas polyuteranskumförband, såsom Allevyn Gentle Border, Kliniderm Foam Silicone Border eller Mepilex Border. Dessutom Sorbact-förband, om såret blir ett hålrum.
- Får gå i bastu och använda smink då sårytan har slutits.

Läkningen

- Den nya huden som bildas på sårytan är tunn och rodnande, men den bleknar efter några veckor.
- Det behandlade området måste skyddas från solen med kläder eller solskyddscreme, med solskyddsfaktorer 50. Områden som exponeras för solen ska skyddas under minst tre månader efter behandlingen.
- På det behandlade området kan ytterligare pigmentation dyka upp, som i allmänhet försvinner efter några månader. Ibland kan det behandlade området se ljusare ut än det omgivande området och det minskade pigmentet på området kan vara permanent.
- Då djupare hudområden laserbehandlas kan det även uppstå ytlig ärrbildning.

Att beakta

- Om du har frågor efter behandlingen, kan du ta kontakt med den behandlande enheten genom att ringa tfn. 02 313 1614 må – fre kl. 8.30 – 11.00 samt må – to kl. 13.00 – 15.00 och fredag kl. 12.00 – 14.00.
- Symtom på bakterieinfektion är plötsligt uppstående värk/smärta, svullnad och feber. Ta kontakt med ÅUCS hudpoliklinik eller den egna hälsovårdscentralen, om det förekommer tecken på infektion i såret, det blöder rikligt eller du har feber över 38°C eller mer.