

## Korrigerig av mitralklaffen med klipps, Mitraclip

Du har fått diagnosen mitralinsufficiens (mitralklaffsvikt). Detta läckage kan repareras med MitraClip®-anordning till en vald patientgrupp.

### Förberedelser före åtgärden

- Du får separata instruktioner om eventuella läkemedels uppehåll och undersökningar som görs före åtgärden.
- Du anländer till sjukhuset antingen kvällen innan åtgärden eller på åtgärds morgonen.
- Kontrollera att ljumskarnas hud inte har eksem eller rodnader.
- Ät eller drick ingenting 6 timmar före åtgärden.

### Åtgärdsförloppet

Åtgärden görs i anestesi/narkos och räcker i cirka 3 timmar. Vid transplantationen för man in MitraClip®-anordningen via venen i ljumskan till hjärtat. Till hjälp används ultraljudsundersökning som görs via matstrupen, röntgenstrålning och kontrastmedel som innehåller jod.

Allvarliga komplikationer är sällsynta.

### Efter åtgärden

Efter åtgärden är du under övervakning enligt läkarens ordination. Du har sängvila i cirka 6 timmar.

Efter åtgärden kommer du att ha besvär i halsen på grund av anestesi och ultraljudsundersökningen som gjorts via matstrupen. Några andra känningar borde inte uppkomma.

Dagen efter åtgärden görs en ultraljudsundersökning av hjärtat. Utskrivningen och eftervård sker individuellt enligt läkarens anvisningar. I allmänhet blir man utskriven 2 dagar efter åtgärden.

MitraClip®-anordningen är inte ett förhinder för magnetundersökning (MRI). Ifall du hamnar att besöka tandläkaren inom 3 månader från reparationen av mitralklaffen till exempel vid tandborttagning, bör antibiotikabehandling påbörjas.

### Kontakta din vårdande enhet

- Om du har infektions symptom eller feber.
- Om du misstänker att du är gravid. Under åtgärden används röntgenstrålar.

[Sydänsairaudet.fi](https://www.sydansairaudet.fi) bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.