

Kontrastundersökning via enterostomi vid vård av barn

I undersökningen utreds tjocktarmens passage och struktur innan barnet genomgår en rekonstruktionsoperation.

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Reservera ungefär 1 timme för undersökningen. Ett barn som behöver en brådskande undersökning får kanske komma på undersökning före ditt barn.

Förberedelser inför undersökningen

Undersökningen kräver inga förberedelser.

Under undersökningen

Barnet ligger på avbildningsbordet under undersökningen. En tunn slang förs in i stomin, och via den sprutas kontrastmedel genom stomin in i tarmen. En röntgenläkare följer med kontrastmedels framfart i tarmen med röntgenbilder. Efter undersökningen tas slangen ut.

Efter undersökningen

Du får undersökningssvaren från den remitterande läkaren. Om du inte vet hur du får svaren, fråga den remitterande polikliniken eller avdelningen.

Annat att observera

Ta med dig barnets FPA-kort eller någon annan legitimation. Dessutom kan du ta med dig en leksak som är viktig för ditt barn. Det är bra om 1 - 2 vuxna är med barnet under undersökningen. Om du är gravid eller misstänker att du är gravid får du inte vara med under avbildningssituationen.

För undersökningen debiteras ingen separat avgift. Det är inte tillåtet att komma till undersökningen om man är förkyld eller akut sjuk. Avboka tiden om du inte kan komma.

Tilläggsuppgifter

Om du har frågor om undersökningen, hittar du kontaktuppgifterna i ankomstanvisningen eller i kallelsebrevet.