

Lumbaldränanvisning för patient

Avsikten med denna anvisning är att ge patienten och hans anhöriga information angående lumbaldränen.

Lumbaldränen är en sluten slanganläggning i vars ena enda finns en samlingspåse för hjärn-ryggmärgsvätska.

Lumbaldränen kan användas om hjärn-ryggmärgsvätska samlas eller rinner från operationssår i huvud- eller ryggradsområdet. Syftet är att lätta på trycket i sårområdet genom att styra överflödigt hjärn-ryggmärgsvätska i en påse via lumbaldränen. Lumbaldränen kan också användas då man undersöker hjärn-ryggmärgsvätskecirkulationen och behovet för en möjlig shuntanläggning, alltså en klaffapparat för hjärn-ryggmärgsvätskan.

Montering av lumbaldränen

Läkaren beordrar monteringen av lumbaldränen. Lumbaldränen monteras i uppvakningsrummet. Åtgärden görs av en anesthesiolog som via en lumbalpunktion för dränröret in mellan ländkotorna i ryggradskanalen. Tiden i uppvakningsrummet är ca 30 minuter varefter man går tillbaka till bäddavdelningen.

Under lumbaldränvården

Man kan röra sig med lumbaldränen. I slanganläggningen finns kran som man kan stänga då man är upprätt, då man ligger ska kranen öppnas. Sjukskötarna anvisar i användningen av lumbaldränen. Lumbaldränspåsen förvaras i sängen då du ligger. Slanganläggningen är fastspänd i din rygg vanligtvis med ett stygn och plastfilm.

Sjukskötarna övervakar ditt mående under vården och följer öven med utsöndringen i samlingspåsen. Lumbaldränen används från fall till fall från några dagar upp till en vecka. Du vistas på sjukhuset under lumbaldränvården.

Berätta sjuksköterskan omedelbart ifall du lider av huvudvärk, illamående, ljuskänslighet i ögonen eller nackstyvhet. Dessa kan vara symptom på inflammation orsakad av lumbaldränen.

Efter lumbaldränvården

Du får inte själv töja på eller ta bort lumbaldränen. Sjuksköterskan avlägsnar slanganläggningen då vården är färdig. Läkaren berättar för dig om möjliga fortsatta åtgärder efter att lumbaldränen avlägsnats.

Vid problemfall

Kontakta i första hand jouren i ditt eget område om:

- du får feber
- injektionssåret rinner
- du får ökande huvudvärk eller illamående
- ditt medvetande försämras eller förvirring förekommer
- dina funktioner saktar ner och kroppstyrkan försämras
- andra problem, som du tror beror på vården du fått, förekommer

Gällande utskrivningen från sjukhuset kan du kontakta sjukskötaren på vardagar 02 3137172 klockan 9-10.

I ärenden som gäller intyg kan du ringa avdelningssekreteraren direct 02 313 2249 vardagar klockan 8-15.

Må så gott!