

Manometriundersökning av matstrupen

Varför görs undersökningen?

Med undersökningen utreder man funktionella störningar i matstrupen. De vanligaste symtomen vid funktionsstörningar i matstrupen är bröstsmärta, besvär med att svälja och halsbränningar.

Hur förbereder jag mig för undersökningen?

- Före undersökningen måste du vara minst **fem timmar** utan att äta eller dricka.
- Ta med medicinlistan över läkemedel, som du använder regelbundet.

Hur går undersökningen till?

Via näsborren förs en tunn kateter till matstrupen, diametern på katetern är ungefär fem millimeter. Vid åtgärden använder man ett gelformigt bedövningsmedel, som sätts på ändan av katetern. Du får en mugg vatten och ett sugrör. Med hjälp av det suger du små klunkar vatten. Samtidigt skjuts katetern försiktigt nedåt med dina sväljningar. En mätkateter tejpas fast i din kind för den tid som registreringen pågår.

Därefter undersöker vi hur sväljningsvågorna i matstrupen rör sig framåt både när du sitter och ligger på rygg. Du kommer att få med spruta små mängder av vatten att svälja, dricka vatten själv från muggen och möjligtvis äta fruktpuré och knäckebröd.

Hur lång tid tar undersökningen?

Undersökningen tar ungefär 60 minuter.

Vad efter undersökningen?

Efter undersökningen kan du genast äta och dricka normalt.

Varifrån får jag höra om undersökningsresultaten?

Resultaten av undersökningen får du från den avdelningen/polikliniken som har begärt undersökningen

Anvisningen granskad 15.5.2025