

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## METAKOLINTEST

Ert barn har reserverats tid till metakolin-andningstest. Testet undersöker ifall barnets luftrör betar sig som i astma. Barnet andas in metakolinspray varefter blåsvärden mäts. Undersökningen är helt smärtfri och tar ca en timme.

Ifall undersökningen görs för att fastställa en diagnos bör man:

- avstå från medicin som **öppnar luftvägarna 12 timmar** före undersökningen (Airomir, Buventol, Ventilastin, Ventoline)
- avstå från **långtidsverkande** luftvägsöppnande medicinering **24 timmar** före undersökningen (t.ex. Oxis, Serevent)
- avstå från regelbundet tagen astmamedicinering (Asmanex, Beclomet, Bufomix, Flixotide, Novopulmon, Pulmicort, Relvar, Seretide, Symbicort) **4 veckor** före undersökningen om man inte kommit överens med läkaren att medicineringen kan användas normalt

Ifall ert barn plötsligt insjuknat i en inflammatorisk sjukdom kontakta underskrivna för att boka en ny tid.

---

sjuksköterska

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.