

Questran® -medicin för gallsyremalabsorption

Questran® -medicinen används mot diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen. Efter måltiden utsöndras galla från gallblåsan. Normalt absorberas gallsyrorna effektivt tillbaka i blodomloppet från slutet av tunntarmen på ca 50-100 cm sträcka. Borttagning av slutdelen av tunntarmen kan resultera i gallsyremalabsorption och då hamnar gallsyrorna i tjocktarmen. Detta kan orsaka diarré. Medicinen absorberar gallsyror i tarmen och förhindrar irritationen i tjocktarmen. Medicinens effekt är bäst på morgonen då gallblåsan är full med galla efter natten.

Påbörjandet av vården

- Medicindosen höjs gradvis för att förhindra biverkningarna.
- Användning av Questran® (4g dospåse) höjning av dosen

	före morgonmål	efter morgonmål	före lunch	före middag
Dag 1	1/2	-	-	-
Dag 2	1/2	-	1/2	-
Dag 3	1/2 - 1	-	1/2 - 1	-
Dag 4	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1	-
Dag 5	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1	1/2 - 1

Långvarig behandling

- Vid långvarig behandling kan upptaget av fettlösliga vitaminerna A, D- och K- minska, därför är det nödvändigt att uppfölja halten av D-vitamin.
- Sträva till den minsta möjliga effektiva dosen för att förhindra biverkningarna (max 4 dospåsar i dagen).

Andra mediciner tillsammans med Questran®

- Questran® -medicinen kan hindra upptaget av andra mediciner såsom t.ex. Marevan®, Digoxin® och Thyroxin®
 - Ta de andra medicinerna exempelvis:
 - minst en timme före Questran® -medicinen eller 4-6 timmar efter Questran® -medicinen.
- Diskutera med den vårdande läkaren tidpunkten då de andra medicinerna tas.