

Slutning/stängning av förmaksbihang

En stängningsanordning kommer att installeras i ditt vänstra förmaksbihang, som förhindrar eventuella koagel att lossna från förmaksbihanget till blodcirkulationen.

Förberedelser inför åtgärden

- Du får separat anvisningar om eventuella läkemedels uppehåll och undersökningar som görs före åtgärden.
- Du anländer till sjukhuset antingen kvällen innan åtgärden eller på åtgärds morgonen.
- Huden i ljumskområdet bör vara i bra skick före åtgärden på grund av operationsområdets infektionsrisk.
- Du får inte äta eller dricka 6 timmar före åtgärden.

Åtgärdsförloppet

Åtgärden görs under anestesi och räcker i cirka en timme. Vid transplantationen för man in stängningsanordningen via venen i ljumskan till hjärtat. Till hjälp används ultraljudsundersökning som görs via matstrupen, röntgenstrålning och kontrastmedel som innehåller jod.

Komplikationerna är sällsynta (1–2 %), det vanligaste problemet efter åtgärden är blödning av punktionsstället. En liten risk för blodcirkulationsstörningar i hjärnan (1 %) samt blodsamling i hjärtsäcken (1 %) hör till åtgärden.

Efter åtgärden

Du vårdas först på uppvakningsrummet till enheten för hjärtåtgärder och sedan flyttas du till bäddavdelningen. Du är i sängläge några timmar efter åtgärden.

Efter åtgärden kommer du att ha besvär i halsen på grund av anestesi och ultraljudsundersökningen som gjorts via matstrupen och det kan uppkomma blåmärke i ljumskområdet. Några andra känningar borde inte uppkomma.

Dagen efter åtgärden görs ultraljudsundersökning av hjärtat och stängningsanordningen läge kontrolleras med en röntgen bild. Hemfärd och eftervård sker individuellt enligt läkarens anvisningar. I allmänhet blir man utskriven 1 - 2 dagar efter åtgärden.

Slutningen av förmaksbihanget är inte ett förhinder för magnetundersökning (MRI). Ifall du hamnar besöka tandläkaren inom 3 månader från slutningen av förmaksbihanget till exempel vid tandborttagning, bör antibiotikabehandling påbörjas.

Kontakta din vårdande enhet

- Om du har infektions symtom eller feber.
- Om du misstänker att du är gravid, under åtgärden används röntgenstrålar.

Sydänsairaudet.fi bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.