

Undersökning av passage genom tjocktarmen, GI-kanal - för barn

Med undersökningen utreder man tjocktarmens funktion p. g. a förstoppning.

Hur förbereder du dig för undersökningen?

Du kommer att få en Transit-Pellets-kapsel med kontrastmedelringar att ge till barnet från den enhet som skickar dig för undersökningen. Kapseln innehåller 10 röntgenpositiva O-ringar av polyvinylklorid.

Barnet ska svälja kapseln under morgonen i 5 dagar före undersökningen. Kapseln kan öppnas och blandas med till exempel puré eller yoghurt. Efter att ha gett kapseln till barnet får du inte ge några laxermedel, lavemang eller suppositorier före undersökningen.

Kapseln bör inte tas på måndag eller tisdag för att tidpunkten för undersökningen inte ska falla in på veckoslutet. Undersökningen kräver inte fasta.

Hur går undersökningen till?

Efter fem dagar från att kapseln har tagits tas röntgenbilder på barnets mage på förmiddagen. Bilderna visar hur många märkesringar som är kvar. Undersökningen är helt smärtfri.

Efter undersökningen

Efter undersökningen får barnet äta och dricka normalt och igen använda eventuella laxermedel. Den remitterande enheten informerar om resultaten av undersökningen.