

Iriitin eli värikalvotulehduksen lääkehoito

1. viikko

Kortisonitippa (esimerkiksi Dexa tai Pred Forte®)

1-2 tippaa tunnin välein kipeään silmään valveillaoloaikana

Mustuaista laajentava tippa (esimerkiksi Oftan Tropicamid®)

1 tippa kolme kertaa päivässä

Dexa tai Ultracortenol voide yöksi

Pidä noin 5-10 minuutin tauko eri tippojen välillä!

2. viikko

Dexa tai Pred Forte tippa joka toinen tunti valveillaoloaikana

Tropicamid 1 tippa kerran päivässä

Dexa tai Ultracortenol voide yöksi

3. viikko

Dexa tai Pred Forte-tippa viisi kertaa päivässä

Dexa tai Ultracortenol voide yöksi

Ei laajennustippaa

4. – 6. viikko

Dexa tippa 2-3 kertaa päivässä. Jos hoidon päätyttyä silmään on jäänyt särkyä tai näkö huonoksi, ota yhteys silmäpoliklinikkaan.

Halutessasi voit käydä terveystarkastuksen omaisesti tarkastuskäynnillä omalla silmälääkärillä yksityispuolella.

Yhteystiedot

Silmätaudit M2, Puhelin 02 627 7841

Maanantaista perjantaihin kello 08.00 – 15.00