

Virtsanäytteenotto, klamydia ja tippuri (U-CtGcNhO 4816)

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään virtsasta bakteereita, jotka aiheuttavat klamydiaa ja tippuria.

Esivalmistelut

Ole virtsaamatta vähintään tunti ennen näytteenottoa.
Silloin virtsanäytteestä saadaan luotettava tulos.

Näytteenottovälineet


Voit noutaa näytteenottovälineet Satakunnan hyvinvointialueen laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.

Tarvittavat välineet

- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra

Näytteenotto:

1. Älä suorita alapesua.
2. Virtsaa purkkiin 20–30 ml.
Se on neljäsosa purkin tilavuudesta.
Virtsan ensimmäiset pisarat on tärkeää saada astiaan.
Virtsaa pitää olla vähintään 10 ml.
Virtsaa ei saa olla yli 30 ml.
Lyhenne ml tarkoittaa millilitraa.
Näytepurkissa on mitta-asteikko.



Tämä on oikea virtsamäärä näytepurkissa.

3. Varmista, että näytepurkissa on
 - nimi
 - henkilötunnus
 - näytteenottopäivämäärä ja –aika.
4. Laita näytepurkki muovipussiin.
Sulje pussi tiiviisti.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Tuo näytepurkki laboratorioon.
Näytepurkissa oleva virtsa säilyy vuorokauden jääkaapissa tai huoneenlämmössä.

Yhteystiedot

Satakunnan hyvinvointialue
Laboratorio
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin
kello 10.00–15.00
Puhelin 02 627 6410

Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.satakunnanhyvinvointialue.fi